




Locația:
ROMÂNIA

Perioada:
**2019
2021**



Populația:
CÂINI 101
PISICI 8



Subiectul:
**BABESIA
CANIS**


CĂPUȘELE & BOLILE TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL CĂPUȘELOR

Babesia canis este prezentă endemic în România, alături de *Anaplasma phagocytophilum* și *Borrelia burgdorferi* s. l.

Ca urmare a creșterii activității și prezenței geografice a căpușelor și a bolilor transmise prin intermediul acestora, pentru a proteja animalele de companie sunt esențiale monitorizarea constantă și protecția pe tot parcursul anului!

SPECIILE DE CĂPUȘE COLECTATE

de la câini și pisici




1.5% *Ixodes hexagonus*

65.7% *Dermacentor reticulatus*

32.8% *Ixodes ricinus*

INCIDENȚA BOLILOR TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL CĂPUȘELOR

în funcție de județ



DATELE DIN STUDIU

despre căpușe și despre bolile transmise prin intermediul căpușelor

A FOST IDENTIFICATĂ

Ehrlichia canis la o căpușă *I. ricinus* tick.

8.1%

dintre căpușe au avut rezultat pozitiv pentru *Anaplasma phagocytophilum*.

PREZENȚA SIMULTANĂ LA CĂPUȘE

a *B. canis* și *A. phagocytophilum* a fost demonstrată în acest studiu.

7.7%

dintre căpușele *I. ricinus* au prezentat *Borrelia burgdorferi* s. l.

14.6%

dintre căpușele *D. reticulatus* colectate au avut rezultat pozitiv pentru *B. canis*

ÎNAINTE,

căpușele *D. reticulatus* erau sporadice în România, însă acum acestea se găsesc în toată țara.

- Incidență foarte ridicată
- Incidență ridicată
- Incidență moderată
- Incidență scăzută
- Nu a fost identificat B. canis
- Nu s-a studiat

